

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ: 2810224948, Fax: 2810225616
Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε τον καταναλωτή και το περιβάλλον

ΕΧΘΡΟΙ -ΑΣΘΗΝΕΙΕΣ ΑΧΛΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΛΙΑΣ



Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής

1.

Στις ορεινές περιοχές (Δαμάστα, Λιβάδι Κρουσώνα, Οροπέδιο Λασιθίου) η βλάστηση έχει ξεκινήσει. Στις μηλιές κυριαρχούν τα στάδια Β και Γ, ενώ στις αχλαδιές τα στάδια Γ₃ και Δ.

ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ : (ΑΧΛΑΔΙΑ-ΜΗΛΙΑ)	Οι συχνές βροχές της περασμένης άνοιξης ευνόησαν την εμφάνιση της ασθένειας και εκδηλώθηκαν σημαντικές προσβολές ιδιαίτερα σε αχλαδιές. Η κρίσιμη περίοδος για μολύνσεις είναι από το στάδιο Γ ₃ της πράσινης κορυφής (μπουμπούκι 1,5 εκ.) μέχρι το στάδιο του καρπιδίου. Την περίοδο αυτή τα δέντρα πρέπει να προστατεύονται.
Οδηγίες:	Παρακολουθείτε τα δελτία καιρού. Σε περίπτωση πρόβλεψης βροχών στα κρίσιμα στάδια, να επεμβαίνετε προληπτικά πριν την εκδήλωση των βροχών ή θεραπευτικά εντός 48 ωρών μετά τη βροχή. Οι αχλαδιές, όπου σημειώνονται και οι σοβαρότερες προσβολές, να καλύπτονται και σε περιόδους που εκδηλώνονται έντονες δροσιές.

<p>ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ : (ΑΧΛΑΔΙΑ-ΜΗΛΙΑ)</p>	<p>Το βακτήριο προκαλεί την καταστροφή ανθέων, κλαδίσκων, κλάδων έως και ολόκληρου του δέντρου. Τα δέντρα είναι πολύ ευαίσθητα στη μόλυνση και ιδιαίτερα οι αχλαδιές, όταν επικρατεί βροχερός και υγρός καιρός στην άνθηση (μέγιστες ημερήσιες θερμοκρασίες πάνω από 18°C και σχετική υγρασία μεγαλύτερη από 60%).</p> <p><i>Οδηγίες:</i> Προληπτικοί ψεκασμοί μέχρι το στάδιο της πράσινης κορυφής με χαλκούχα σκευάσματα και από την πράσινη κορυφή μέχρι και την πτώση των πετάλων με Λαμιναρίν ή Aureobasidium pullulans, περιορίζουν την ανάπτυξη της ασθένειας.</p> <p><i>Συστάσεις:</i> Επιθεωρείτε τα δέντρα τακτικά μετά την άνθηση. Αν διαπιστώνονται ύποπτα συμπτώματα (μικρά ή μεγάλα τμήματα σαν καμένα από φωτιά) να αφαιρούνται προσεκτικά μαζί με υγιές τμήμα 20 - 25 εκ. και να καίγονται άμεσα.</p> <p>Τα εργαλεία θα πρέπει να απολυμαίνονται συνεχώς κατά την αφαίρεση των ύποπτων τμημάτων με οινόπνευμα του εμπορίου.</p>
---	--

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Σας αποστέλλουμε τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών των εχθρών και ασθενειών των μηλοειδών για το έτος 2012, τις οποίες παρακαλούμε **να κρατήσετε σε αρχείο.** Κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου να επιλέγετε τα κατάλληλα σκευάσματα από τις λίστες αυτές.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα πλαίσια εφαρμογής της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και της ορθολογικής χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σύμφωνα με το Νόμο 4036/2012, οι επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει να καταγράφουν και να τηρούν σε αρχείο για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια τα παρακάτω στοιχεία:

- Όνομα φυτοπροστατευτικού προϊόντος
- Ημερομηνία εφαρμογής
- Δόση εφαρμογής
- Περιοχή
- Καλλιέργεια

Η παραπάνω καταγραφή διευκολύνει διαχρονικά την αξιολόγηση των εφαρμογών με σκοπό την μείωση της χρήσης τους και του σχετικού κόστους, συμβάλλει στην μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων της χρήσης γεωργικών φαρμάκων στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον και προωθεί τη χρησιμοποίηση της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας των καλλιεργειών.

Σε περίπτωση μη καταγραφής προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 13 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α'8) και συγκεκριμένα πρόστιμο από χίλια (1.000) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

Ηράκλειο 26 Μαρτίου 2012
Ο Προϊστάμενος Δ/σης
Τρουλλάκης Γιάννης