

# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο  
Τηλ: 2810224948, Fax: 2810225616  
Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα [www.minagric.gr](http://www.minagric.gr)

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων. Έτσι προστατεύετε τον καταναλωτή και το περιβάλλον

## ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ

### Α Μ Π Ε Λ Ι

Πληροφορίες : Νίκος Ι. Μπαγκής

6.

Βλαστικά στάδια αμπελιών στην ποικιλία σουλτανίνα

Στις πρώιμες περιοχές ολοκληρώνεται η καρπόδεση, οι μεσοπρώιμες βρίσκονται στην άνθηση και οι όψιμες περιοχές στην έναρξη του μούρου.

<b>ΩΙΔΙΟ :</b> <i>Διαπιστώσεις:</i>	– Είναι η σημαντικότερη ασθένεια των αμπελιών της Κρήτης. – Ευνοείται από τις καιρικές συνθήκες και οι κύκλοι της ασθένειας είναι σύντομοι και αλληπάλληλοι. Οι έντονες και ανεξέλεγκτες προσβολές του Ιουνίου οφείλονται σε μολύνσεις που γίνονται αυτή την εποχή (άνθηση - καρπόδεση).
<i>Οδηγίες:</i>	<b>Τα στάδια άνθησης - καρπόδεσης είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα και πρέπει να προστατεύονται.</b> Στην άνθηση να προτιμηθεί το θειάφι σε σκόνη. Σε θερμοκρασίες πάνω από 28 °C το θειάφι μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.
<b>ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ :</b> <i>Οδηγίες:</i>	– Οι συνθήκες που επικράτησαν δεν ευνόησαν τον περονόσπορο. Η ασθένεια περιορίζεται σε «εστιακές τοποθεσίες» που σημειώνονται συχνές έντονες δροσιές. – <u>Δεν χρειάζονται γενικευμένοι ψεκασμοί.</u> Ελέγχετε συστηματικά τα αμπέλια. Λόγω της ευαισθησίας του σταδίου της άνθησης - καρπόδεσης, <u>στις περιοχές που έχει εκδηλωθεί η ασθένεια τα αμπέλια πρέπει να είναι προστατευμένα.</u>
<b>ΕΥΔΕΜΙΔΑ :</b>	Αναμένεται η έναρξη της πτήσης της δεύτερης γενιάς στην παραλιακή πρώιμη ζώνη. Θα ενημερωθείτε με το επόμενο δελτίο.
<b>ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ :</b> <i>Οδηγίες:</i>	Αμπέλια που βρίσκονται κοντά σε ζιζάνια, δένδρα και καλλωπιστικά φυτά (καλαμιά, κυπαρίσσι, δαμασκηλιά, κισσός, μηλιά, βάτος, κλπ) φιλοξενούν τους πρώτους πληθυσμούς. Στις πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές άρχισε η μετακίνηση του στα αμπέλια. Να γίνει έλεγχος και αν διαπιστώνονται πληθυσμοί να γίνει συνδυασμένη επέμβαση με το ωίδιο.
<b>ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ :</b>	Η πτήση των αρσενικών ξεκίνησε. Κάτω από το ρυτίδωμα παρατηρούνται νύμφες κι ενήλικα. Δεν διαπιστώνονται ακόμα ωσσωροί και έρπουσες. Μην κάνετε ακόμα επέμβαση. Θα ενημερωθείτε με το επόμενο δελτίο.
<b>ΘΡΙΠΕΣ :</b>	Σε επιτραπέζια σταφύλια με προσβολές την περασμένη χρονιά να γίνει επέμβαση στο στάδιο της άνθησης - καρπόδεσης.

**ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:** Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπελώνες στους οποίους έχει γίνει χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Συνέχεια στην πίσω σελίδα

# Ε Λ Ι Α

Πληροφορίες : MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη

**ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ:** Στις πρώιμες περιοχές ολοκληρώθηκε το στάδιο της καρπόδεσης στην ελιά. Στις μεσοπρώιμες συνεχίζεται η άνθηση και η πτώση πετάλων των ανθέων και στις όψιμες περιοχές ξεκινάει η άνθηση.

<b>ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ:</b>  <i>Διαπιστώσεις:</i>  <i>Οδηγίες:</i>	<p>Στις <b>πρώιμες και στις παραλιακές περιοχές</b> ξεκίνησε η πτήση της καρπόβιας γενιάς του πυρηνοτρήτη μέσα στο 1<sup>ο</sup> δεκαήμερο του Μαΐου. Οι συλλήψεις στις φερομονικές παγίδες αυξάνονται και παρατηρούνται οι πρώτες ωτοκοκίες στους μικρούς καρπούς.</p> <p>Το έντομο γεννάει τα αυγά του κυρίως πάνω στον κάλυκα και οι νεαρές προνύμφες εισέρχονται κατευθείαν μέσα στον καρπό. Στόχος της καταπολέμησης είναι η θανάτωση των νεαρών προνυμφών όταν μπαίνουν ή λίγο πριν μπουν στον καρπό.</p> <p>Συνιστάται ψεκασμός κάλυψης με κατάλληλα εγκεκριμένα εντομοκτόνα:</p> <p>- <b><u>Πρώιμες και παραλιακές περιοχές: 20 - 22 Μαΐου.</u></b></p> <p><b>Μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν οι ελαιώνες με μέτρια καρποφορία.</b> Για τις ημερομηνίες των επεμβάσεων στις <b>μεσοπρώιμες και όψιμες περιοχές</b> θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο.</p>
<b>ΡΥΓΧΙΤΗΣ:</b> <b>(Μπίμπικας)</b>  <i>Ζημιές:</i>  <i>Οδηγίες:</i>	<p>Οι ανοιξιάτικες προσβολές είναι περιφερειακά φαγώματα στα τρυφερά φύλλα και στις βλαστικές κορυφές από τα ενήλικα. Μετά το τέλος της καρπόδεσης τρέφονται στους καρπούς και αργότερα ωτοκοκούν σε αυτούς. Οι προνύμφες προσβάλουν μόνο τον πυρήνα των καρπών προκαλώντας πρόωρη καρπόπτωση το φθινόπωρο.</p> <p>Σε ελαιώνες που παρατηρήθηκαν ζημιές τα δύο προηγούμενα χρόνια και διαπιστώνονται ανοιξιάτικες προσβολές στο φύλλωμα, να γίνει ένας ψεκασμός των δέντρων <b><u>αμέσως μετά την ολοκλήρωση της καρπόδεσης.</u></b> Με την εκλογή κατάλληλου εντομοκτόνου (ντιμεθοείτ) γίνεται συνδυασμένη αντιμετώπιση με τον πυρηνοτρήτη.</p>
<b>ΩΤΙΟΡΥΓΧΟΙ:</b>  <i>Οδηγίες:</i>	<p>Είναι νυχτόβια σκαθάρια που ανεβαίνουν στα δέντρα από τον κορμό τις νυχτερινές ώρες. Προκαλούν αποφύλλωση, πτώση ανθοταξιών και καρπόπτωση. Χαρακτηριστικός είναι ο τρόπος που κατατρώγουν περιφερειακά τα φύλλα (πριονωτά) όπως και η καρπόπτωση που συντελείται μαζί με τον ποδίσκο του καρπού.</p> <p>Όπου παρατηρούνται έντονες προσβολές να γίνει ψεκασμός του λαιμού και των κορμών των δέντρων με ένα εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο μεγάλης υπολειμματικής διάρκειας.</p>

**ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:** Οι επεμβάσεις κατά των εχθρών και των ασθενειών του αμπελιού και της ελιάς να γίνονται με την επιλογή των κατάλληλων φαρμάκων από τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών που σας έχουμε αποστείλει.

Ηράκλειο 16 Μαΐου 2012  
Ο Προϊστάμενος Δ/σης  
Τρουλλάκης Γιάννης