

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ: 2810224948, Fax: 2810225616
Email: pkrpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε τον καταναλωτή και το περιβάλλον

			
Μύγα Μεσογείου	Νύγματα σε ρόγες	Στοές που ξεκινούν από τα νύγματα	Οι στοές είναι επιφανειακές

ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

Πληροφορίες : Νίκος Ι. Μπαγκής

16.

ΕΥΔΕΜΙΔΑ: Η τρίτη γενιά του εντόμου εξελίσσεται με υψηλούς πληθυσμούς. Υπενθυμίζεται ότι στις προσβολές της γενιάς αυτής αναπτύσσονται σήψεις.
Οδηγίες : Συνιστάται επαναληπτικός ψεκασμός το διάστημα:

Μεσοπρώιμες περιοχές

- Επιτραπέζια: **24 - 26 Ιουλίου**
- Σουλτανίνες - οινάμπελα: **26 - 28 Ιουλίου.**

Οψιμες περιοχές

- Επιτραπέζια: **27 - 29 Ιουλίου**
- Σουλτανίνες - οινάμπελα: **29 - 31 Ιουλίου.**

Στις **πρώιμες**, στις **ενδιάμεσες** περιοχές (μεταξύ πρώιμης και μεσοπρώιμης ζώνης) και στην περιοχή της **κάτω Μεσσαράς** συνιστάται νέος επαναληπτικός ψεκασμός. Μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν τα σταφύλια που προορίζονται για επιτραπέζια χρήση.

Πρώιμες - Ενδιάμεσες περιοχές, Κάτω Μεσσαρά : **26 - 28 Ιουλίου.**

Σταφύλια που θα τρυγηθούν πριν το τέλος του Ιουλίου δεν χρειάζονται καταπολέμηση.

Τρόπος επέμβασης: Ψεκασμός ή σκόνισμα. Το φάρμακο να καλύπτει όλα τα σταφύλια. Σε αμπέλια που θα τρυγηθούν σύντομα, να χρησιμοποιηθούν σκευάσματα μικρής υπολειμματικής διάρκειας. Να τηρούνται αυστηρά οι χρόνοι αναμονής μεταξύ ψεκασμού και συγκομιδής.

Συνέχεια στην πίσω σελίδα

<p>ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ:</p> <p><i>Οδηγίες:</i></p>	<p>Διανύουμε την πιο κρίσιμη περίοδο για την εμφάνιση εστιακών προσβολών σε περιοχές που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια.</p> <p>Να συνεχιστούν οι συστηματικοί έλεγχοι στα <u>επιτραπέζια σταφύλια</u> και παρουσία του εντόμου ή με την εμφάνιση συμπτωμάτων (παραπάνω φωτογραφίες) να γίνεται άμεση καταπολέμηση.</p>
<p>ΟΞΙΝΗ ΣΗΨΗ:</p>	<p>Υπενθυμίζεται <u>η αδυναμία καταπολέμησης της ασθένειας με χημικά μέσα</u> και η ανάγκη εφαρμογής μιας σειράς μέτρων όπως:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Σταφύλια χωρίς ζημιές από έντομα, ασθένειες (ευδεμίδα, ωίδιο, μύγα, κ.λ.π.) και τραύματα από μηχανικές βλάβες. • Χαμηλή υγρασία στο αμπέλι (μειωμένα ποτίσματα μετά το γυάλισμα). • Καλός αερισμός των σταφυλιών. • Απομάκρυνση των προσβεβλημένων ρωγών και σταφυλιών. • Καταπολέμηση δροσόφιας.
<p>ΩΪΔΙΟ:</p>	<p>Σταφύλια που προορίζονται για επιτραπέζια χρήση έχουν ανάγκη προστασίας και μετά το γυάλισμα. Να συνεχιστεί η προστασία.</p>

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι επεμβάσεις κατά των εχθρών και των ασθενειών του αμπελιού πρέπει να γίνονται με επιλογή των κατάλληλων φαρμάκων σύμφωνα με τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών που σας έχουμε αποστείλει.

Ηράκλειο 23 Ιουλίου 2012
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Τρουλλάκης Γιάννης