

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
& ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Πληροφορίες : Μ. Ζ. Ροδιτάκη

Τηλ. : 2810.224948

Να κρατηθεί σε αρχείο

Φυτοπροστατευτικά μυκητοκτόνα με έγκριση στην καλλιέργεια της ελιάς

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ	ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ	ΓΛΟΙΟΣΠΟΡΙΟ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (Ημέρες)
KRESOXIM-METHYL (ΚΡΕΣΟΞΙΜ-ΜΕΘΥΛ)	+			ελιές βρώσιμες: 2 ελιές ελαιοποιήσιμες: 3	ελιές βρώσιμες: 0 ελιές ελαιοποιήσιμες: 30
TRIFLOXYSTROBIN (ΤΡΙΦΛΟΞΙΣΤΡΟΒΙΝ)	+			2 Μόνο 1 εφαρμογή κατά τη διάρκεια του Φθινοπώρου	14
DODINE (ΝΤΟΝΤΙΝ)	+		+	2	15
CALCIUM COPPER SULFATE, σε Cu (ΧΑΛΚΟΣ, ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ)	+	+	+	2	21
COPPER OXYCHLORIDE, σε Cu (ΘΕΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΧΑΛΚΟΣ)	+	+	+	2	21
TRIBASIC COPPER, σε Cu (ΤΡΙΒΑΣΙΚΟΣ ΘΕΙΪΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ)	+	+	+	2	21
COPPER HYDROXIDE, σε Cu (ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ)	+	+	+	2	21
COPPER OXIDE, σε Cu (ΥΠΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ)	+			2	21

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (οδηγία 91/414/Ε.Ε.) Χρησιμοποιήστε με σύνεση τα φυτοφάρμακα. Διαβάζετε προσεκτικά την ετικέτα συσκευασίας. Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης.

Ηράκλειο, Μάρτιος 2013

