

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ: 2810224948, Fax: 2810225616
Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε τον καταναλωτή και το περιβάλλον

ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ (ΠΡΩΙΜΕΣ , ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΟΨΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) (Το δελτίο αφορά τις πρώιμες, ενδιάμεσες και όψιμες περιοχές)



Ευδεμίδα. Προσβολή σε νεαρή ράγα. Διακρίνεται η σπή εισόδου και τα αποχωρήματα της νεαρής προνύμφης.



Ευδεμίδα. Μία προνύμφη συνήθως χρειάζεται 1-2 ράγες για να ολοκληρώσει την ανάπτυξη της.



Τζιτζικάκι. Ενήλικα άτομα σε φύλλο.



Ωίδιο. Προσβολές στις ράγες και εμφάνιση γκριζόλευκου χνουδιού (καρποφορίες του μύκητα).

Πληροφορίες : Νίκος Ι. Μπαγκής – Βαγγέλης Α. Αλατσατιανός

11.

ΕΥΔΕΜΙΔΑ :
(*Lobesia botrana*)

Οδηγίες:

Στις **όψιμες περιοχές**, στο δίκτυο παγίδευσης, παρατηρούνται υψηλοί πληθυσμοί και πυκνές φωτοκίες.

Συνιστάται **επαναληπτικός ψεκασμός** στις παρακάτω ημερομηνίες:

- **Όψιμες περιοχές** (όπως Αλάγνι, Χουμέρι, Καστέλλι Πεδιάδος, Λαράνι, Γέργερη, Αγ.Βαρβάρα, Πρινιάς, Ανώγεια, οροπέδιο Χανδρά, κλπ).

Επιτραπέζια: **13 - 14 Ιουνίου.**

Σταφιδάμπελα - οινάμπελα: **14 - 16 Ιουνίου.**

Στις **πρώιμες και ενδιάμεσες** περιοχές η δεύτερη πτήση ολοκληρώνεται.

Διαπιστώνονται αραιές φωτοκίες που δικαιολογούν **άμεσο επαναληπτικό ψεκασμό** στα σταφύλια που προορίζονται για **επιτραπέζια χρήση** στις παρακάτω ημερομηνίες :

-**Πρώιμες παραλιακές περιοχές** (όπως Σητεία, Πισκοκέφαλο, Χερσόνησος, Μάλια, Γούβες, Καρτερός, Γάζι, περιοχή Τυμπακίου, κλπ) : **12 - 13 Ιουνίου.**

-**Ενδιάμεσες περιοχές** (ανάμεσα από τις πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές, όπως Καλέσα, Βούτες, Βασιλειές, Σπήλια, Βάθεια, Σκαλάνι, Καπαριανά, Μοίρες, Πόμπια) : **13 - 14 Ιουνίου.**

Τρόπος επέμβασης:

Το φάρμακο να πηγαίνει σε όλα τα σταφύλια και να τα καλύπτει. Τα κρομμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται.

ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ: (<i>Empoasca spp.</i>)	Σε αμπέλια με προσβολές να γίνεται συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.
ΩΙΔΙΟ: (<i>Erysiphe necator</i>)	Υπενθυμίζεται ότι τα βλαστικά στάδια του αμπελιού και οι καιρικές συνθήκες της εποχής ευνοούν την ασθένεια. Να συνεχιστεί η προστασία των αμπελιών.

- Δεν επιτρέπεται συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπέλια που έχει γίνει χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών.
- Οι επεμβάσεις κατά των εχθρών και ασθενειών του αμπελιού να γίνονται με την επιλογή των κατάλληλων φαρμάκων από τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών που σας έχουν αποσταλεί.

Ηράκλειο 11 Ιουνίου 2013
Ο Προϊστάμενος Δ/σης
Τρουλλάκης Γιάννης