

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ: 2810224948, Fax: 2810225616
Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε τον καταναλωτή και το περιβάλλον

ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ



Πορτοκάλι προσβεβλημένο από Μύγα Μεσογείου.

Εσωτερικό πορτοκαλιού με προνύμφες της Μύγας Μεσογείου.

Κορυφοξήρα: Αποφύλλωση και ξηράνσεις κλαδιών από την κορυφή προς τη βάση σε δέντρα λεμονιάς.

Πληροφορίες: MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη –MSc, PhD Αργυρή Γ. Καλλιουάκη

5.

ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ: (*Ceratitis capitata*)

Αντιμετώπιση:

Συστάσεις:

Στο δίκτυο παγίδευσης οι συλλήψεις παρουσιάζουν άνοδο. Οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για σοβαρές προσβολές στις πρώιμες ποικιλίες πορτοκαλιών και μανταρινιών. Οι καρποί προσβάλλονται με την έναρξη της ωρίμανσης.

Συστήνεται εφαρμογή δολωματικών ψεκασμών στο ξεθώριασμα του πράσινου χρώματος των καρπών. Το δόλωμα αποτελείται από νερό, ελκυστική ουσία (υδρολυμένη πρωτεΐνη) και το εγκεκριμένο σκεύασμα με δραστική λάμδα-σιαλοθρίν.

Ψεκάζετε σειρά παρά σειρά εναλλάξ, φροντίζοντας το ψεκαστικό υγρό να κατευθύνεται υπό μορφή χονδρών σταγονιδίων στο εσωτερικό των δέντρων, σε **κλαδιά χωρίς καρπούς**, στον κορμό και περιμετρικά σε θάμνους και φράκτες. Όσο οι καιρικές συνθήκες παραμένουν ευνοϊκές μπορούν να γίνουν μέχρι δύο εφαρμογές ανά 14 ημέρες.

Οι ψεκασμοί κάλυψης του φυλλώματος ξεκινούν στην ωρίμανση των καρπών και επαναλαμβάνονται ανάλογα με τη διάρκεια δράσης του σκευάσματος που θα χρησιμοποιηθεί.

Οι δολωματικοί ψεκασμοί είναι προτιμότεροι για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και για τη διασφάλιση των ώριμων καρπών από υπολείμματα φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων.

Συνιστάται συνδυασμός μαζικής παγίδευσης με δολωματικούς ψεκασμούς για αποτελεσματικότερο έλεγχο του εντόμου.

ΚΟΡΥΦΟΞΗΡΑ:

(*Deuterphoma tracheiphila*)

Συμπτώματα:**Οδηγίες:**

Ασθένεια του ξύλου που προσβάλλει κυρίως λεμονιές, κιτριές και νεραντζιές. Εκδηλώνεται αρχικά με απότομο κιτρίνισμα και ξήρανση των φύλλων σε μερικούς βλαστούς και στη συνέχεια με ξήρανση από την κορυφή προς τη βάση κλαδίσκων και βραχιόνων του δένδρου.

Τα δένδρα είναι ευπαθή το φθινόπωρο και το χειμώνα. Οι μολύνσεις εννοούνται από την ύπαρξη πληγών και υγρασίας.

- Αφαίρεση των ξηρών κλάδων μαζί με υγιές τμήμα 15-20 εκατ. και κάψιμο κατά τη ξηρή περίοδο. Εκρίζωση και κάψιμο των ξηρών δέντρων.

- Αποφυγή κλαδεμάτων και οργωμάτων από το φθινόπωρο έως αργά την άνοιξη. Επίσης πρέπει να αποφεύγονται οι τραυματισμοί κλάδων, κορμού και ριζών και τυχόν πληγές να προστατεύονται με κατάλληλα σκευάσματα.

- Η χρήση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού και ανθεκτικών ποικιλιών, είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος αντιμετώπισης της ασθένειας.

Συστήνονται κατά τη διάρκεια της βροχερής περιόδου 2 - 3 προληπτικοί ψεκασμοί με χαλκούχα σκευάσματα. Ο πρώτος ψεκασμός γίνεται το φθινόπωρο, πριν την έναρξη των βροχών. Έκτακτοι ψεκασμοί πρέπει να γίνονται αμέσως μετά από χαλαζόπτωση ή παγετό.

ΝΕΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ: Στα εντομοκτόνα σκευάσματα για την καλλιέργεια των εσπεριδοειδών προστέθηκε η δραστική **Lambda Cyhalothrin** (λάμδα σιαλοθρίν) με έγκριση στην καταπολέμηση της Μύγας Μεσογείου (ψεκασμοί κάλυψης και δολωματικοί ψεκασμοί) και των αφίδων (ψεκασμοί κάλυψης) με χρόνο αναμονής 7 ημέρες πριν τη συγκομιδή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιλέγεται τα κατάλληλα φάρμακα από τις λίστες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που σας έχουμε αποστείλει. Φροντίζετε να τηρούνται αυστηρά οι χρόνοι που αναγράφονται στις συσκευασίες μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής.

Ηράκλειο 3 Οκτωβρίου 2013

Ο Προϊστάμενος Δ/σης

Τρουλλάκης Ιωάννης