

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (μυκητοκτόνα) με έγκριση στην καλλιέργεια του αμπελιού

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ	ΩΙΔΙΟ	ΒΟΤΡΥΤΗΣ	ΦΟΜΟΨΗ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (Ημέρες)
azoxystrobin + folpet (οινοποιήσιμα) ΑΖΟΞΥΣΤΡΟΜΠΙΝ + ΦΟΛΠΕΤ	+	+		+	3	42
azoxystrobin ΑΖΟΞΥΣΤΡΟΜΠΙΝ	+	+			3	21
dimethomorph + pyraclostrobin ΝΤΙΜΕΘΟΜΟΡΦ + ΠΥΡΑΚΛΟΣΤΡΟΜΠΙΝ	+	+			3	35
triadimenol + folpet ΤΡΙΑΝΤΙΜΕΝΟΛ + ΦΟΛΠΕΤ	+	+			2	42 Οινοποιήσιμα/ Επιτραπέζια μέχρι τέλος της άνθησης
sulphur + copper oxychloride ΘΕΙΟ + ΧΑΛΚΟΣ (με επίπασση)	+	+			3	21
propineb + triadimenol ΠΡΟΠΙΝΕΜΠ + ΤΡΙΑΝΤΙΜΕΝΟΛ	+	+			2	35
folpet ΦΟΛΠΕΤ	+		+	+	4	42 Οινοποιήσιμα/ Επιτραπέζια μέχρι τέλος της άνθησης
folpet + copper oxychloride ΦΟΛΠΕΤ + ΧΑΛΚΟΣ	+		+	+	3	42 Οινοποιήσιμα/ Επιτραπέζια μέχρι τέλος της άνθησης
famoxadone + mancozeb ΦΑΜΟΞΑΝΤΟΝ + ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ	+			+	3	28
cymoxanil + maneb ΣΥΜΟΞΑΝΙΛ+ΜΑΝΕΜΠ	+			+	4	28
fosetyl aluminium + folpet ΦΟΣΕΤΥΛ-ΑΛ+ΦΟΛΠΕΤ	+			+	3	42 Οινοποιήσιμα/ Επιτραπέζια μέχρι τέλος της άνθησης
metalaxyl + folpet ΜΕΤΑΛΑΞΥΛ + ΦΟΛΠΕΤ	+			+	4	Στο τέλος της άνθησης
mancozeb ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ	+			+	2 ή 4	28
dithianon ΝΤΙΘΙΑΝΟΝ	+			+	4	28
maneb ΜΑΝΕΜΠ	+			+	4	28
propineb + fluopicolide ΠΡΟΠΙΝΕΜΠ + ΦΛΟΥΑΠΙΚΟΛΙΝΤ	+			+	2	56
metiram ΜΕΤΙΡΑΜ	+				3	56
metiram + ametoktradin ΜΕΤΙΡΑΜ + ΑΜΕΤΟΚΤΡΑΝΤΙΝ	+				3	35
fosetyl aluminium ΦΟΣΕΤΥΛ - ΑΛ	+				4	14 ή 28 οινοποιήσιμα (ανάλογα το σκεύασμα)
mandipropamid ΜΑΝΤΙΠΡΟΠΑΜΙΝΤ	+				3	21
cymoxanil + fosetyl al + mancozeb ΣΥΜΟΞΑΝΙΛ + ΦΟΣΕΤΥΛ-ΑΛ + ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ	+				4	28
fosetyl aluminium + mancozeb ΦΟΣΕΤΥΛ-ΑΛ + ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ	+				3	28
benalaxyl + copper oxychloride ΜΠΕΝΑΛΑΞΥΛ + ΧΑΛΚΟΣ	+				3	μέχρι λίγο μετά την άνθηση

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ	ΩΔΙΟ	ΒΟΤΡΥΤΗΣ	ΦΟΜΟΨΗ	ΜΕΤΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (Ημέρες)
benalaxyl + mancozeb ΜΠΕΝΑΛΑΞΥΛ + ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ	+				3	42
benalaxyl-m + mancozeb ΜΠΕΝΑΛΑΞΥΛ-Μ + ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ	+				3	42
benthiavalicarb-isopropyl + mancozeb ΜΠΕΝΘΙΑΒΑΛΙΚΑΡΜΠΙ+ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ	+				3	28
famoxadone + cymoxanil ΦΑΜΟΞΑΝΤΟΝ + ΣΥΜΟΞΑΝΙΑ	+				6	28
fenamidone + fosetyl aluminium ΦΟΣΕΤΥΛ - ΑΛ + ΦΕΝΑΜΙΝΤΟΝ	+				2	28
zoxamide + mancozeb ΖΟΞΑΜΙΝΤ + ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ	+				4	28
zoxamide + tribasic copper sulfate ΖΟΞΑΜΙΝΤ + ΧΑΛΚΟΣ	+				2-8	28
cymoxanil + copper ΣΥΜΟΞΑΝΙΑ + ΧΑΛΚΟΣ	+				3 ή 4	21
cymoxanil + copper + maneb ΣΥΜΟΞΑΝΙΑ+ΧΑΛΚΟΣ+ΜΑΝΕΜΠ	+				4	28
cymoxanil + mancozeb ΣΥΜΟΞΑΝΙΑ+ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ	+				4	28
fosetyl aluminium + fluopicolide ΦΟΣΕΤΥΛ - ΑΛ + ΦΛΟΥΑΠΙΚΟΛΙΝΤ	+				2	28
fosetyl aluminium + copper oxychloride ΦΟΣΕΤΥΛ - ΑΛ + ΧΑΛΚΟΣ	+				3	21
metalaxyl + copper oxychloride ΜΕΤΑΛΑΞΥΛ + ΧΑΛΚΟΣ	+				3	μέχρι τέλος της άνθησης
metalaxyl-m + copper oxychloride ΜΕΤΑΛΑΞΥΛ-Μ + ΧΑΛΚΟΣ	+				4	21
metalaxyl + mancozeb ΜΕΤΑΛΑΞΥΛ + ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ	+				3	μέχρι λίγο μετά την άνθηση
metalaxyl-m + mancozeb ΜΕΤΑΛΑΞΥΛ-Μ+ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ	+				4	28
metalaxyl-m + folpet (οινοποιήσιμα) ΜΕΤΑΛΑΞΥΛ-Μ+ΦΟΛΠΕΤ	+				4	42
iprovalicarb + copper oxychloride ΙΠΡΟΒΑΛΙΚΑΡΜΠΙ + ΧΑΛΚΟΣ	+				3	20
dimethomorph + copper oxychloride ΝΤΙΜΕΘΟΜΟΡΦ + ΧΑΛΚΟΣ	+				3	21
mandipropamid + mancozeb ΜΑΝΤΙΠΡΟΠΑΜΙΝΤ + ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ	+				2	28
dimethomorph + mancozeb ΝΤΙΜΕΘΟΜΟΡΦ + ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ	+				4	28
dimethomorph + folpet ΝΤΙΜΕΘΟΜΟΡΦ + ΦΟΛΠΕΤ	+				3	42 Οινοποιήσιμα/ Επιτραπέζια μέχρι τέλος της άνθησης
benthiavalicarb + folpet (οινοποιήσιμα) ΜΠΕΝΘΙΑΒΑΛΙΚΑΡΜΠΙ + ΦΟΛΠΕΤ	+				3	42
dimethomorph + dithianon ΝΤΙΘΙΑΝΟΝ + ΝΤΙΜΕΘΟΜΟΡΦ	+				3	28
calcium copper sulfate ΧΑΛΚΟΣ (ΒΟΡΑΙΓΑΛΕΙΟΣ)	+				4	21
copper oxychloride ΧΑΛΚΟΣ (ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ)	+				3	21
tribasic copper sulfate ΧΑΛΚΟΣ (ΤΡΙΒΑΣΙΚΟΣ)	+				2	21
copper hydroxide ΧΑΛΚΟΣ (ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ)	+				4	21
calcium copper sulfate + maneb ΧΑΛΚΟΣ + ΜΑΝΕΜΠ	+				4	28

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ	ΩΔΙΟ	ΒΟΤΡΥΤΗΣ	ΦΟΜΟΨΗ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (Ημέρες)
propineb ΠΡΟΠΙΝΕΜΠ	+				4	60
dimethomorph ΝΤΙΜΕΘΟΜΟΡΦ	+				4	10
mandipropamid + copper oxychloride ΜΑΝΤΙΠΡΟΠΑΜΙΝΤ + ΧΑΛΚΟΣ	+				4	21
mancozeb + copper oxychloride ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ + ΧΑΛΚΟΣ	+				3	28
potassium hydrogen carbonate ΟΞΙΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΚΑΛΙΟ		+	+		8	1
myclobutanil ΜΥΚΛΟΜΠΟΥΤΑΝΙΛ		+			3	21
penconazole ΠΕΝΚΟΝΑΖΟΛ		+			2	35
cyproconazole ΣΑΪΠΡΟΚΟΝΑΖΟΛ		+			4	28
tebuconazole ΤΕΜΠΟΥΚΟΝΑΖΟΛ		+			2	21
tetraconazole ΤΕΤΡΑΚΟΝΑΖΟΛ		+			2	14
triadimenol ΤΡΙΑΝΤΙΜΕΝΟΛ		+			2	35
fluopyram + tebuconazole ΦΛΟΥΟΠΥΡΑΜ + ΤΕΜΠΟΥΚΟΝΑΖΟΛ		+			3	14 Οινοποίηση
fenbuconazole ΦΕΝΜΠΟΥΚΟΝΑΖΟΛ		+			2	28
spiroxamine ΣΠΙΡΟΞΑΜΙΝ		+			4	14 Επιτραπέζια 35 Οινοποίηση
bupirimate ΜΠΟΥΠΙΡΙΜΕΪΤ		+			4	14
kresoxim-methyl ΚΡΕΣΟΞΙΜ-ΜΕΘΥΛ		+			3	35
trifloxystrobin ΤΡΙΦΛΟΞΥΣΤΡΟΜΠΙΝ		+			3	28
quinoxifen ΚΙΝΟΞΙΦΕΝ		+			4	21 Επιτραπέζια 30 Οινοποίηση
proquinazid ΠΡΟΚΟΥΙΝΑΖΙΝΤ		+			3	28
meptyldinocap ΜΕΠΤΥΛΑΝΤΙΝΟΚΑΠ		+			4	21
ampelomyces quisqualis ΑΜΠΕΛΟΜΥΚΕΣ ΚΟΥΙΣΚΟΥΑΛΙΣ		+			12	0
tebuconazole + trifloxystrobin ΤΕΜΠΟΥΚΟΝΑΖΟΛ + ΤΡΙΦΛΟΞΥΣΤΡΟΜΠΙΝ		+			2	35
difenoconazole + cyflufenamid ΝΤΙΦΕΝΟΚΟΝΑΖΟΛ + ΣΥΦΛΟΥΦΕΝΑΜΙΝΤ		+			2	21
boscalid + kresoxim-methyl ΜΠΟΣΚΑΛΙΝΤ + ΚΡΕΣΟΞΙΜ-ΜΕΘΥΛ		+			3	35
sulphur (επίπασση ή βρέξιμο) ΘΕΙΑΦΙ		+			4	7
metrafenone ΜΕΤΡΑΦΕΝΟΝ		+			3	28
laminarin ΛΑΜΙΝΑΡΙΝ		+			10	—
cyflufenamid ΣΥΦΛΟΥΦΕΝΑΜΙΝΤ		+			2	21

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ	ΩΔΙΟ	ΒΟΤΡΥΗΣ	ΦΟΜΟΨΗ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (Ημέρες)
thiophanate-methyl (οινοποιήσιμα) ΘΕΙΟΦΑΝΕΪΤ ΜΕΘΥΛ			+		1	35
iprodione ΙΠΡΟΝΤΙΟΝ			+		2	14 ή 21 (ανάλογα το σκεύασμα)
boscalid ΜΠΟΣΚΑΛΙΝΤ			+		1	28
mepanipyrim ΜΕΠΑΝΙΠΙΡΙΜ			+		1	21
pyrimethanil ΠΥΡΙΜΕΘΑΝΙΑ			+		3	35
fenhexamid ΦΕΝΕΞΑΜΙΝΤ			+		2	7 Επιτραπέζια 14 Οινοποιήσιμα
fluazinam ΦΛΟΥΑΖΙΝΑΜ			+		4 οινοπ. 1 επιτρ.	21 Οινοποιήσιμα - Επιτραπέζια στην άνθηση
fludioxonil ΦΛΟΥΝΤΙΟΞΟΝΙΑ			+		1 έως 3	7 Επιτραπέζια 21 Οινοποιήσιμα
fludioxonil + cyprodinil ΦΛΟΥΝΤΙΟΞΟΝΙΑ+ΣΙΠΡΟΝΤΙΝΙΑ			+		1	7 Επιτραπέζια 21 Οινοποιήσιμα
thiram (οινοποιήσιμα) ΘΕΙΡΑΜ			+		3	35

**ΟΜΑΔΕΣ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ F.R.A.C.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ**

ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ	ΟΜΑΔΑ
ΑΖΟΧΥΣΤΡΟΜΠΙΝ, ΦΕΝΑΜΙΝΤΟΝ, ΦΑΜΟΞΑΝΤΟΝ, ΠΥΡΑΚΛΟΣΤΡΟΜΠΙΝ, ΤΡΙΦΛΟΞΥΣΤΡΟΜΠΙΝ, ΚΡΕΖΟΧΙΜ ΜΕΘΥΛ	1η
ΣΑΙΠΡΟΚΟΝΑΖΟΛ, ΦΕΝΜΠΟΥΚΟΝΑΖΟΛ, ΜΥΚΛΟΜΠΟΥΤΑΝΙΑ, ΠΕΝΚΟΝΑΖΟΛ, ΤΡΙΑΝΤΙΜΕΝΟΛ, ΤΕΜΠΟΥΚΟΝΑΖΟΛ, ΤΕΤΡΑΚΟΝΑΖΟΛ	2η
ΜΕΤΑΛΛΑΞΥΛ, ΜΕΤΑΛΛΑΞΥΛ- Μ, ΜΠΕΝΑΛΛΑΞΥΛ, ΜΠΕΝΑΛΛΑΞΥΛ - Μ	3η
ΣΥΜΟΞΑΝΙΑ	4η
ΜΑΝΤΙΠΡΟΠΑΜΙΝΤ, ΝΤΙΜΕΘΟΜΟΡΦ, ΠΡΟΒΑΛΙΚΑΡΜΠ, ΜΠΕΝΘΙΑΒΑΛΙΚΑΡΜΠ	5η
ΦΟΖΕΤΥΛ - ΑΛ	6η
ΦΛΟΥΑΠΙΚΟΛΙΝΤ	7η
ΖΟΞΑΜΙΝΤ	8η
ΦΛΟΥΑΖΙΝΑΜ, ΜΕΠΤΥΛΑΝΤΙΝΟΚΑΠ	9η
ΜΠΟΥΠΙΡΙΜΕΪΤ	10η
ΘΕΙΟΦΑΝΕΪΤ ΜΕΘΥΛ	11η
ΦΛΟΥΝΤΙΟΞΟΝΙΑ	12η
ΙΠΡΟΝΤΙΟΝ	13η
ΜΠΟΣΚΑΛΙΝΤ, ΦΛΟΥΟΠΥΡΑΜ	14η
ΦΕΝΕΞΑΜΙΝΤ	15η
ΜΕΠΑΝΙΠΙΡΙΜ, ΠΥΡΙΜΕΘΑΝΙΑ, ΣΙΠΡΟΝΤΙΝΙΑ	16η
ΣΠΙΡΟΞΑΜΙΝ	17η
ΚΙΝΟΞΥΦΕΝ, ΠΡΟΚΟΥΙΝΑΖΙΝΤ	18η
Οι δραστικές ουσίες ΑΜΠΕΛΟΜΥΚΕΣ ΚΟΥΣΚΟΥΑΛΙΣ (βιολογικό), ΟΞΙΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΚΑΛΙΟ, ΧΑΛΚΟΣ, ΛΑΜΙΝΑΡΙΝ, ΜΕΤΡΑΦΕΝΟΝ, ΣΥΦΛΟΥΦΕΝΑΜΙΝΤ, ΘΕΙΑΦΙ, ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ, ΜΑΝΕΜΠ, ΠΡΟΠΙΝΕΜΠ, ΜΕΤΙΡΑΜ, ΝΤΙΘΙΑΝΟΝ, ΦΟΛΠΕΤ, παρουσιάζουν το μικρότερο κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας και μπορούν να εναλλάσσονται μεταξύ τους και με άλλες ομάδες για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση και τη διαχείριση της ανθεκτικότητας.	

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα.

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός, δεν αντικαθιστά την ετικέτα και υπόκειται σε τροποποιήσεις.

Ηράκλειο, Μάρτιος 2014