

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ: 2810224948, Fax: 2810225616
Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε τον καταναλωτή και το περιβάλλον

Ε Χ Θ Ρ Ο Ι Τ Η Σ Ε Λ Ι Α Σ



Λεκάνιο: Προσβολή ελαιόδέντρου και ανάπτυξη καπνιάς.

Ρυγχίτης: Προσβεβλημένοι καρποί με χαρακτηριστικές οπές τύπου «κρατήρα».

(Φωτογραφίες: Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου)

Πληροφορίες: MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη, MSc, PhD Αργυρή Γ. Καλλιονάκη

18.

ΛΕΚΑΝΙΟ:
(*Saissetia oleae*)

Οδηγίες:

Ευνοείται σε περιοχές με υψηλή σχετική υγρασία και σε δέντρα με πυκνό φύλλωμα. Σε έντονες προσβολές αναπτύσσονται δευτερογενώς πάνω στα μελιτώματά του μύκητες της καπνιάς προκαλώντας εξασθένηση των δέντρων.

- Το κατάλληλο κλάδεμα εξασφαλίζει καλό αερισμό και φωτισμό στο εσωτερικό των δέντρων.
- Αποφυγή υπερβολικών αζωτούχων λιπάνσεων και αρδεύσεων.
- Συστήνεται επέμβαση μόνο στα δέντρα που παρατηρούνται σοβαρές προσβολές:

Μεσοπρώιμες περιοχές : 4 - 8 Ιουλίου

Όψιμες περιοχές : 10 - 13 Ιουλίου

Συστάσεις:

Προτείνεται η χρήση εντομοκτόνων χαμηλής τοξικότητας για την προστασία των ωφέλιμων εντόμων. Όταν χρησιμοποιούνται παραφινικά λάδια τα δέντρα πρέπει να είναι καλά ποτισμένα και η θερμοκρασία να μην ξεπερνάει τους 32° C.

<p>ΡΥΓΧΙΤΗΣ : ή μπίμπικας (<i>Rhynchites cribripennis</i>)</p> <p><i>Διαπιστώσεις:</i></p> <p><i>Οδηγίες:</i></p>	<p>Παρατηρούνται <u>εκτεταμένες κατά τόπους</u>, σημαντικές προσβολές από το ρυγχίτη στους καρπούς και πρόωρη καρπόπτωση. Σε προηγούμενα δελτία (Νο 10, 12 & 14) συστήθηκε επέμβαση κατά των ενηλίκων μετά το τέλος της καρπόδεσης. Αυτή την περίοδο η δυνατότητα αντιμετώπισης είναι περιορισμένη διότι οι ωοτοκίες έχουν ξεκινήσει και οι προνύμφες αναπτύσσονται μέσα στον πυρήνα.</p> <p><u>Ελέγχετε τους ελαιώνες, ιδιαίτερα όπου υπάρχει ιστορικό προσβολής από ρυγχίτη.</u> Σε περιοχές που παρουσιάζονται προσβολές για πρώτη χρονιά συνιστάται έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση την επόμενη χρονιά.</p>
---	---

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Οι επεμβάσεις να γίνονται με την επιλογή των κατάλληλων φαρμάκων από τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών που σας έχουμε αποστείλει.

Η αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς «Πρόγραμμα Δακοκτονίας» βρίσκεται στην αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) κάθε Περιφερειακής Ενότητας, όπου και μπορείτε να απευθύνεστε για πληροφορίες.

Ηράκλειο 2 Ιουλίου 2014
Ο Προϊστάμενος Δ/σης
Τρουλλάκης Γιάννης